
Calendrier des vaccinations 2024 : points clés sur les nouveautés

Le calendrier vaccinal 2024 a été publié le 26 avril 2024.ⁱ

Il présente un nombre conséquent de nouveautés du fait d'une part de la **commercialisation de nouveaux vaccins**, et d'autre part de l'élaboration de **nouvelles recommandations vaccinales** en lien avec l'épidémiologie.

A RETENIR : le calendrier vaccinal est un **état des lieux à un instant T** ; il est susceptible d'être mis à jour en fonction des actualités liées à la vaccination, comme la **publication de décrets** mettant en œuvre des obligations vaccinales.

Nouveautés liées à la commercialisation de nouveaux vaccins :

SHINGRIX® : vaccin contre le **zona**, recommandé dès l'âge de 65 ans, (ou 18 ans en cas d'immunodépression) ; administré selon un schéma à 2 doses : M0-M2.

Peut s'administrer également après un délai d'au moins 1 an entre une infection antérieure de zona ou une vaccination avec Zostavax®.

VAXNEUVANCE® : vaccin conjugué 15-valent contre les infections à **pneumocoques chez les nourrissons, enfants et adolescents jusqu'à 17 ans révolus**.

La primovaccination contre le pneumocoque est obligatoire chez tous les enfants nés à compter du 1^{er} janvier 2018, en utilisant le vaccin pneumococcique conjugué 15-valent Vaxneuvance®, **ou** le vaccin pneumococcique conjugué 13-valent Prevenar13®, selon un schéma à deux injections M2-M4, suivies d'une dose de rappel à M11.

Chez les enfants et adolescents âgés de 2 ans à 17 ans révolus, **à risque élevé d'infection invasive pneumococcique**, le schéma Vaxneuvance® **ou** Prevenar13® suivi du Pneumovax® s'applique.

PREVENAR 20® : vaccin conjugué 20-valent contre les infections à pneumocoques, chez **l'adulte de plus de 18 ans**.

Chez l'adulte de plus de 18 ans **à risque élevé d'infection invasive pneumococcique**, la vaccination contre le pneumocoque doit être effectuée **préférentiellement** avec le vaccin conjugué 20-valent Prevenar20® selon un **schéma simplifié à une seule dose**.

Si les personnes ont déjà reçu antérieurement une dose de Prevenar13® ou une dose de Pneumovax® on administre une dose de Prevenar20® si la vaccination antérieure remonte à plus de 1 an.

Si les personnes ont déjà été vaccinées avec la séquence Prevenar13®- Pneumovax®, on administre une dose de Prevenar20® en respectant un délai minimal de 5 ans après la précédente injection de Pneumovax®.

Nouveautés en lien avec l'épidémiologie :

- Remplacement de la vaccination contre les infections invasives à méningocoques du séro groupe C par la **vaccination tétravalente ACWY**.

La vaccination méningococcique tétravalente ACWY est désormais recommandée chez tous les **adolescents âgés de 11 à 14 ans**, indépendamment de leur statut vaccinal, selon un schéma à **une dose**, en utilisant les vaccins tétravalents Nimenrix® ou MenQuadfi® ou Menveo®.

Par ailleurs, dans le cadre du rattrapage vaccinal, cette vaccination ACWY est recommandée **jusqu'à 24 ans révolus**.

Chez le nourrisson de moins de 1 an, la vaccination ACWY est réalisée avec Nimenrix® (MenQuadfi®) à l'AMM à partir de 12 mois, et Menveo® à partir de 2 ans), selon un schéma vaccinal à **deux doses** M6-M12.

A noter : tout schéma vaccinal initié avec le vaccin Nimenrix® devra être complété avec ce même vaccin. Par ailleurs, une vaccination initiée avec un vaccin monovalent C Neisvac® chez les nourrissons peut être poursuivie avec un vaccin méningococcique tétravalent ACWY.

ⁱ https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_avril24.pdf