

Vaccination Méningocoques

Risques & Impact sanitaire

Méningocoque : bactérie retrouvée naturellement dans la **gorge** et le **nez** de nombreuses personnes (*ados +++*)

🇫🇷 2025, bilan des infections :

- 50 % des cas liés aux méningocoques B, 50 % aux W et Y
 - **571 infections invasives** → **méningites (75%) et septicémies (25%)**
- Séquelles **neurologiques** : 20 à 30 %
→ **DÉCÈS** : 10 à 20 %

Personnes les plus touchées :

- **Nourrissons et jeunes enfants** (1 à 4 ans)
- **Adolescents et jeunes adultes** (15 à 24 ans)

Pour en savoir + : Ministère de la santé - Foire aux questions

Public cible

Enfants

souches ACWY et B

6 à 24 mois
Obligatoire

2 à 4 ans
Rattrapage

5 à 11 ans : pas de recommandation

Adolescents

11 à 24 ans
Vaccin souches **ACWY**

15 à 24 ans
Vaccin souche **B**

Couverture vaccinale

🇫🇷 2024 :

1 dose à 8 mois

B

81,9%

ACWY

88,6%

Encore un effort !

Ce sont des vaccins obligatoires !

Source : SPF 31/12/2025

Prévenir la transmission

Précautions respiratoires autour du malade

→ **jusqu'à 24 h** après le début de l'antibiothérapie adaptée

Cas contacts

→ Antibioprophylaxie et vaccination pour les **contacts à risque**

Pour prévenir un portage et une infection



[outil MATIS](#)



INSTRUCTION
DGS/59201/18/163
du 27 juillet 2018

Transmission

Par la **salive** ou les **gouttelettes** respiratoires

Lors de **contacts rapprochés et prolongés** (porteur sain et malade)

Adultes et > 65 ans également protégés par la **diminution du portage** grâce à la vaccination des ados



Couverture vaccinale élevée = **immunité collective**

Prévention

1 seul moyen = la vaccination !

• **Vaccin méningocoques ACWY** **Nimenrix®** (dès 6 semaines) **Menquadfi®** (dès 1 an) **Menveo®** (dès 2 ans)

+ 1 dose à 6 et 12 mois *Rattrapage de 1 à 4 ans révolus (1 dose)*
+ 1 dose entre 11 et 14 ans *Rattrapage jusqu'à 24 ans révolus*

• **Vaccin méningocoques B** **Bexsero®** (dès 2 mois) **Trumemba®** (dès 10 ans)

+ 1 dose à 3, 5 et 12 mois *Rattrapage de 1 à 4 ans révolus* → 1 à 2 ans : M0,2,8
+ 2 doses (M0,M6)* entre 15 et 24 ans révolus
2 à 4 ans : M0,6

* Trumemba® : M0,M6 ; Bexsero® M0,M1 minimum mais idéalement M0,M6 → Bulletin Infovac N° 5 mai 2025
** En cas d'intense circulation virale les schémas de vaccination seront adaptés



Une vaccination bien réalisée, c'est une infection grave évitée !